

- ①他の歯に比べて、周囲組織が炎症を起こしやすい位置関係にあります。
- ②いったん、炎症を起こすと、大きな病気となります。
- ③体の調子が悪いときに、炎症を起こしやすくなります。
- ④ひとつ前の奥歯が虫歯や歯周病になりやすくなります。
- ⑤歯並びを悪くします。
- ⑥口の中を狭くし、頬、舌、歯肉を噛み易くなります。

さらに詳しくは、待合室にある「親知らずはなぜ抜くの？(砂書房)」という本をお読みください。

親知らずの抜歯は、20歳頃がベストだと思われます。年齢が経つほど骨が硬化し、抜歯が困難になります。また、感染してからでは、抜歯後の症状が強くなります。

特に女性の場合、妊娠中に親知らずに痛みや腫れが出てくるのがよくあります。妊娠中には、つわりなどの影響で、歯磨きが十分にできず、口腔内が不潔になりやすく、体調も不良のため、症状悪化することが多いとされています。

また、妊娠中に急性症状を引き起こした場合は、胎児への感染の恐れ、抗生物質・鎮痛剤の副作用も考えねばなりません。是非、女性の方は早めに親知らずを抜歯してください。



Grade	手術時間	手術難易度	術後症状※
1	5分	簡単	弱い
5	5	5	5
10	1時間	難しい	強い

親知らずの生え方・深さ・神経までの距離などにより、抜歯の難易度、術後の症状が違います。

あなたの親知らずの抜歯の Grade はおおよそ次のとおりです。

右上 ()	左上 ()
右下 ()	左下 ()

※術後症状：出血・痛み・腫れ・発熱・内出血など

また、下顎管に近い親知らずの場合、術後に下唇の麻痺が起きることがあります。

その辺は十分気をつけて手術を行います。約10%の確率でどうしてもおこりうることです。

Grade 5～10の比較的難易度が高い抜歯の場合、術後2～3時間後痛みがピークになります。痛みが発生する前にお休みされることをお勧めします。次の日は、自発痛はほとんどなくなります。頬の腫れは術後1～2日がピークになり、徐々に小さくなります。

その他ご質問があれば何なりとおっしゃってください。

特に、手術に対する不安が強い方は、大学病院での全身麻酔、静脈内鎮静法や入院は有効だと思います。

ご希望の方は紹介状をお書きします。

山辺歯科

長崎市川口町1-1-105

Tel:(095)844-0357

URL : <http://www.yamabe-dc.com/>

✉ : info@yamabe-dc.com